

enozyme

Bitki metabolizmasını düzenler

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>: W/W</u>	
Suda Çözünür Mangan (Mn)		: % 0.7
EDTA Şelatlı Mangan (Mn)	: % 0.2	
Suda Çözünür Çinko (Zn)		: % 3
EDTA Şelatlı Çinko (Zn)	: % 0.3	

◆ Bitkinin daha sağlıklı olması için bitki besin maddelerinden azami fayda sağlamasına yardımcı olur.

◆ Çeşit kalitesinin geliştirir.

◆ Bitki metabolik strese karşı iyi direnç gösterir

İtalya daki AR&GE merkezimizde geliştirilen enozyme **indivo polymixing** tekniği ile üretilmiştir.



EC FERTILIZER



enozyme



- ❁ Pestisitlerin sebep olabileceği stresi önler.
- ❁ Bitki metabolik şoklara karşı daha iyi direnç gösterir
- ❁ Çiçeklenme ve meyve tutumunda artış sağlar ve erkencilik sağlar.
- ❁ Çeşit kalitesinin geliştirir.
- ❁ Olumsuz hava koşullarına, hastalık ve zararlılara bitkinin direncini artırır.

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Elma, Armut, Ayva, Narenciye	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır. Taç yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.	100 lt suya 50 - 75 cc
Şeftali, Erik, Kiraz, Badem,	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır. Taç yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.	100 lt suya 50 - 75 cc
Fındık, Zeytin, Antep fıstığı	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır. Taç yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.	100 lt suya 50 - 75 cc
Bağ	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, İkinci uygulama bundan 25 - 30 gün sonra	100 lt suya 50 - 75 cc
Pamuk	İlk uygulama tarak başlangıcında ikinci uygulama ise birinci ilaçlamadan 25- 30 gün sonra	100 lt suya 50 - 75 cc
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır, vs.	İlaçlama kardeşlenme başlangıcında yapılır. Mısır ve çeltikte ise ikinci boğum oluştuğunda uygulama yapılır	100 lt suya 50 - 75 cc
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Salatalık	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında; İkinci uygulama meyve teşekkülünde yapılır.	100 lt suya 50 - 75 cc
Soğan, Sarımsak, Ispanak, Marul,	İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10 - 15 gün sonra tekrarlanır.	100 lt suya 50 - 75 cc
Süs bitkileri	İlk uygulama bitkiler 10 - 20 cm yükseklikte iken yapılır ve 3 - 4 hafta sonra tekrarlanır.	100 lt suya 50 - 75 cc
Çilek	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ve ikinci uygulama 3 - 4 hafta sonra	Yeterli miktarda su ile 50 - 75 cc/ da
Yonca, Yem bitkileri	Bitkiler 10 - 15 cm. iken ilk uygulama yapılır ve her kesimden sonra yine bitkiler 10 15 cm iken tekrarlanır.	Yeterli miktarda su ile 50 - 75 cc/ da
Şeker pancarı, Patates	İlk uygulama yumrular oluşmaya başladığında yapılır ve 20 - 30 gün sonra tekrarlanır.	Yeterli miktarda su ile 50 - 75 cc/ da

Damlamadan veya topraktan kullanımda doz dekara 250 cc olabilir. Toprakтан kullanım tohum çimlenmesine, ağaçlarda kılcal kök gelişimine yardımcı olur.