



# MUSTAN



EC FERTILIZER

İÇERİK : W/W  
**Çinko (Zn)** : % 10  
**Bor (B)** : % 10

*Çiçeklenme, polen gelişimi, meyve oluşumu gübresi*

- İtalya araştırma merkezinde geliştirilmiştir.
- Üretimde Indivo Şelatlama Teknolojisi kullanılmıştır.
- Alımını hızlandırmak ve etkisini artırmak için amino asitler eklenmiştir.
- Çabuk eriyen kristal yapıdadır.
- Genel dozu 80-100 gr /100 LT su olmakla birlikte bitkilere göre kullanım miktarı ambalaj etiketinde verilmiştir.
- 1 Kg luk PPE torbalardadır.





# MUSTAN



Meyve ağaçlarında Bor ve çinko meyve tutumuna ve kalitesine doğrudan etkilidir.

Çinko ek olarak takip eden yılda meyve verecek sürgünlerin oluşumuna doğrudan etkilidir.

Bor ve çinko noksanlığı zeytinde periyodiziteye sebep olur.

## EKSİKLİK BELİRTİLERİ:

Bor eksikliğinde, çiçeklerde polen oluşumunda düştüğünden meyve tutumunda azalma olur.

Olan az miktardaki meyvelerde de şekil bozukluğu görülür. → Zarar tespit edildiğinde iş işten geçmiştir.

Çinko eksikliğinde, meyve sürgünlerinin oluşumu zorlaşır. Ağacın direnci düşer ve verim azalır. Genç yaprakların rengi, yaşlı yapraklara göre açık yeşildir.

